



ACTELIC® 5

Insetticida-acaricida liquido specifico per il trattamento dei cereali immagazzinati.

COMPOSIZIONE

Pirimifos metile puro g.5;

Coadiuvanti, solventi q.b. a g.100

ACTELIC 5 agisce per contatto e asfissia in modo rapido e duraturo contro gli insetti adulti e allo stadio di larva e gli acari nocivi ai cereali immagazzinati.

Combatte: calandre o punteruoli, tribolio, silvano, trogoderma, ed altri coleotteri, vera tignola del grano, tignola grigia delle provviste alimentari, ed in genere gli insetti che frequentano i magazzini e i depositi, e l'acaro della farina. La sua efficacia non è modificata dal calore o dall'umidità dei cereali. ACTELIC 5 non altera il potere germinativo dei semi di cereali e non modifica le caratteristiche panificatorie delle farine ricavate da cariossidi trattate.

MODALITA' DI IMPIEGO

Dose: 8-16 ml/q.le di cereali.

- Il prodotto va applicato tale e quale, con idoneo apparecchio distributore, all'atto dell'immagazzinamento, su cereali già sottoposti alla consueta pulitura.
- Prima di introdurre i cereali è sempre consigliabile procedere ad una pulizia a fondo degli ambienti, bruciando le immondizie ed effettuando un trattamento preventivo alle pareti ed ai soffitti con

ACTELIC 5 in formulazione emulsionabile.

- I cereali destinati all'alimentazione umana e del bestiame devono essere sottoposti ad adeguato processo di pulitura prima della molitura.

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

COMPATIBILITA'

Dato il particolare metodo di applicazione, il prodotto si usa tale e quale.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci.

E' nocivo per il bestiame.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi indicati in etichetta. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Conservare la confezione ben chiusa.

Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi

Quanto riportato sulla presente scheda è conforme all'etichetta approvata dal Ministero della Sanità

Newpharm S.r.l.

S.Giustina in Colle (PD) – Tel. (+39) 049.9302876 – Fax (+39) 049.9320087 – info@newpharm.it – www.newpharm.it

d'acqua.

Non operare contro vento.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

In locali chiusi data la sua volatilità, è consigliabile indossare una maschera antipolvere.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.

Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale; edema polmonare.

Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).

Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.

Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.

Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.

Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Consultare un Centro Antiveneni.

DA NON VENDERSI SFUSO

CONFEZIONE: It 5 – It 25

Registrazione Ministero della Sanità n. 11687 del 12.06.2003

© Marchio registrato di una società del gruppo Syngenta