

K-Obiol® EC25

Prodotto concentrato emulsionabile a lunga durata di protezione per la disinfestazione dei cereali in granella immagazzinati. *K-Obiol EC25* agisce per contatto ed ingestione sulle forme libere degli insetti. Le forme protette all'interno dei chicchi vengono distrutte non appena escono dalle cariossidi. Il trattamento con *K-Obiol EC25* protegge i cereali per 6-12 mesi a seconda della dose impiegata. *K-Obiol EC25* è adatto a trattamenti su nastri trasportatori, coclee ed alla base degli elevatori (in corrispondenza della caduta del cereale dal nastro o dal redler) mediante pompe che assicurino una distribuzione uniforme della miscela sulle cariossidi. *K-Obiol EC25* non trasmette alcun odore alla derrata trattata e non altera la germinabilità dei semi.

Consigli per il corretto impiego

La dose più bassa si impiega per una protezione di 6 mesi circa, la più alta per una protezione di 9-12 mesi. Diluire 1-2 litri di *K-Obiol EC25* in 100 litri d'acqua e distribuire uniformemente un litro di emulsione ogni tonnellata di cereale all'atto dell'immagazzinamento mediante un'attrezzatura idonea alla spruzzatura su nastro trasportatore, coclea, elevatore. Per ottenere i migliori risultati è indispensabile una distribuzione uniforme. Prima di introdurre le derrate si consiglia di effettuare una accurata pulizia e disinfestazione di silos e magazzini. Controllare regolarmente il corretto funzionamento della pompa dosatrice ed effettuare la pulizia degli ugelli della pompa dopo averne terminato l'uso.



| Colture | Parassiti | Dose | Note | Tempo di carenza gg |
|-----------------------------------|--|--|--|---------------------|
| Cereali in granella immagazzinati | <i>Sitophilus</i> spp. (Calandra), <i>Oryzaephilus surinamensis</i> (Silvano), <i>Tribolium</i> spp. (Tribolio), <i>Rhizopertha dominica</i> (Cappuccino), <i>Sitotroga cerealella</i> , <i>Ephesia kuehniella</i> , <i>Plodia interpunctella</i> (Tignole), <i>Tenebroides mauritanicus</i> (Struggigrano), <i>Tenebrio molitor</i> (Tenebrione), <i>Trogoderma</i> spp. (Trogoderma), <i>Stegobium paniceum</i> (Stegobio del pane), <i>Bruchus</i> spp. (Tonchi) | 10-20 ml/ton di cereale diluiti in 1 litro d'acqua | Trattamento diretto alle derrate. | 2 |
| | | 1 litro/hl | Trattamento diretto ai sacchi di cereale 1 litro di emulsione ogni 20 m ² di superficie da disinfestare. | |

| | |
|--------------------------------|---|
| Composizione | Deltametrina 2,66% (=25 g/L) Piperonilbutossido 23,9% (=225 g/L) |
| Formulazione | Concentrato emulsionabile |
| Avvertenze | Nocivo - Xn |
| Registrazione Min. San. | 6557 del 07.11.1985 |



Confezione

Imballo

12 x 1 litro