

K-Obiol® ULV6

È un prodotto pronto all'impiego a lunga durata d'azione per la protezione dei cereali in granella immagazzinati. *K-Obiol ULV6* agisce per contatto e ingestione sulle forme libere degli insetti. Le forme protette all'interno dei chicchi vengono distrutte non appena escono dalle cariossidi. Il trattamento con *K-Obiol ULV6* protegge i cereali per 6-12 mesi a seconda della dose impiegata. *K-Obiol ULV6* è adatto per trattamenti, in impianti meccanizzati di grosse dimensioni, alla base degli elevatori (in corrispondenza della caduta del cereale dal nastro trasportatore o dal redler) mediante pompe che assicurino una distribuzione uniforme sulle cariossidi.

K-Obiol ULV6 non trasmette alcun odore alla derrata trattata e non altera la germinabilità dei semi.

Consigli per il corretto impiego

La dose più bassa si impiega per una protezione di 6 mesi circa, la più alta per una protezione di 9-12 mesi. *K-Obiol ULV6* viene distribuita tal quale mediante idonee attrezzature a basso volume che nebulizzano il prodotto sulla derrata all'atto dell'immagazzinamento. Per assicurare una distribuzione omogenea ed evitare perdite per deriva è necessario installare l'ugello in condotti chiusi e dove il grano è "sciolto". Generalmente queste condizioni si verificano nel punto di caduta alla base od alla sommità degli elevatori. Prima di introdurre le derrate si consiglia di effettuare una accurata pulizia e disinfestazione di silos e magazzini. Controllare regolarmente il corretto funzionamento della pompa dosatrice ed effettuare la pulizia degli ugelli e della pompa dopo averne terminato l'uso.



Culture	Parassiti	Dose	Note	Tempo di carenza gg
Cereali in granella immagazzinati	<i>Sitophilus</i> spp. (Calandra), <i>Oryzaephilus surinamensis</i> (Silvano), <i>Tribolium</i> spp. (Tribolio), <i>Rhizopertha dominica</i> (Cappuccino), <i>Sitotroga cerealella</i> , <i>Ephesia kuehniella</i> , <i>Plodia interpunctella</i> (Tignole), <i>Tenebroides mauritanicus</i> (Struggigrano), <i>Tenebrio molitor</i> (Tenebrione), <i>Trogoderma</i> spp. (Trogoderma), <i>Stegobium paniceum</i> (Stegobio del pane), <i>Bruchus</i> spp. (Tonchi)	42-84 ml/ton di cereale	Trattamento diretto alle derrate.	2

Composizione

Deltametrina 0,68% (=6 g/L)

Piperonilbutossido 6,05% (=54 g/L)

Formulazione

Soluzione ULV pronta all'uso

Avvertenze

Non classificato

Registrazione Min. San.

6557 del 07.11.1985

Confezione

Imballo

5 litri

4 x 5 litri